



| <b>Qualitätskriterien</b>   |       |
|---|-------|
| Nachblutung innerhalb von 30 Tagen 3%                                   | 1 %   |
| R 1 endozervikal 10 %   | 13 %  |
| Rezidiv CIN 2/3 5%  | 3 %   |
| Reop in 3 Monaten (inklusive Vulva) 5 %                                 | 0 %   |
| CIN 2+ im Konus 90%   | 98 %  |
| Histo gut beurteilbar 90%   | 100 % |
| ppv major change für CIN 2/3 65 %                                       | 80 %  |
| PE's dokumentiert 100 Fälle (ausschließlich Zervix)                     | 137   |
| OP's dokumentiert 100 Fälle (ausschließlich Zervix) HSK 105, Stenose 37 | 145   |
| Zufriedenheitsrate der Patientinnen (488/542)                           | 90 %  |

# Abklärungskolposkopie 2024 n=378




- CIN 2
- CIN 3
- AIS
- PE CA
- Adeno CA
- Kein > HSIL

# Kurative Kolposkopie 2024 n=140




- CIN 2
- CIN 3
- AIS
- PE CA
- Adeno CA
- Kein > HSIL


Verteilung häufigster Eingriffsarten 2024  
n=858




R-Status nach Schlingenexzision 2024  
n=239



### Office Hysteroskopie 2024 n=108



Größere ambulante Operationen 2024 n=98



- Diagnostische LSK
- Operative LSK (Adnexe, Myom)
- LAVH
- LAVH & Sentinel LNE
- Staging LNE
- Vulvektomie & Sentinel LNE